

ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У РОЗВИТКУ НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ

Василишин Х. І., Куропятник Н. П., Хрін Н. В., Чижик О. Є., Климовець М. М., студ. 3-го курсу

Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. О. І. Сміян

СумДУ, кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами ПП і ДП,

КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»

Пневмонія є одним із найпоширеніших захворювань дітей раннього віку, яке характеризується високим рівнем летальності, що робить цю проблему актуальною як з медичної, так і з соціальної точки зору.

За даними різних авторів у структурі легеневої патології дітей раннього віку гострі пневмонії складають біля 80%.

Нами було обстежено 69 дітей, хворих на позагоспітальну пневмонію, які перебували на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні №1 Сумської міської дитячої лікарні. В їх числі було 44 хлопчиків (63,8%) та 25 дівчаток (36,2%). Серед дітей, які захворіли на позагоспітальну пневмонію 32 (46,4%) були діти до одного року, а 37 (53,6%) – старше року. Встановлено, що суттєвий вплив на частоту виникнення даного захворювання у дітей мають: приналежність до чоловічої статі, вік дітей до року, ускладнення під час вагітності та пологів, соматичні захворювання батьків, ускладнений перебіг неонатального періоду (37,7%), часті ГРВІ, характер вигодовування (60,1% дітей знаходилися на штучному вигодовуванні), соціально-побутові умови життя, рівень освіти батьків.

Таким чином, вищезазначені фактори ризику розвитку негоспітальних пневмоній треба враховувати дільничним педіатрам та сімейним лікарям при спостереженні за дітьми раннього віку.